

気道異物の除去(1歳~成人)

反応(意識)がある場合

苦しそうな仕草



喉に物が詰まると
声が出せない!

「喉が詰まった
のですか?」

尋ねる

相手がうなづく
(窒息!)

「119番」を依頼

応援を呼ぶ

可能な限り

咳を続けさせる

まずは

腹部突き上げ法

効果がなければ

背部叩打法



握りこぶしの親指側を、
相手のへそより上、
みぞおちの十分下方へ
当てる。
これを
他方の手
で包んで、
素早く手前上方に圧迫
する(突き上げる)。



手の付け根で、
肩甲骨の間を
力強く連続して
たたく。

※ 相手が起き上がれない
場合は、背部叩打法
のみ実施。



- ※ 明らかな妊婦や、
高度な肥満者に、行ってはならない!
(背部叩打法のみ実施)
- ※ 腹部突き上げ法を行ったら、
そのことを救急隊へ伝える。

異物が取れるか 反応がなくなるまで続ける!


反応(意識)がない(なくなった)場合

応援を呼ぶ

「119番」を依頼
「AED」を手配

床など硬いところに寝かせて

ただちに心肺蘇生法を開始



口の中に異物が見えたら、
これを取り除く。

※ 口の中に異物が見えない場合、
異物を探すことに時間をかけ
ずに、心肺蘇生法を続ける!